



Els ocells a l'estany d'Ivars i Vila-sana




Guia bàsica per a l'observació i identificació d'ocells



Estany d'Ivars i Vila-sana



- Punts on es pot observar:**
1. cames llargues
 2. ànec collverd
 3. agró roig
 4. cigonya blanca
 5. fofia
 6. balquer
 7. esplugabous
 8. arpella
 9. gavina vulgar
 10. gavià argentat
 11. polla d'aigua
 12. cabussó emplomallat



Els ocells més comuns d'observar a l'estany – Primavera/Estiu

CAMES LLARGUES (*Himantopus himantopus*)




Blanc, amb ales i dors negres i potes vermelles, extremadament primes i llargues, que li donen un aspecte desmanegat. En vol, les potes li sobresurten clarament per darrere el cos. Hiverna bàsicament a l'Àfrica.
Quantitat: 3-10 parelles

L'ànec més abundant i gran, predecessor dels ànecs domèstics. Mascle amb cap verd, estret collaret blanc, pit castany i cos grisenc. Femella bruna amb un pigallat clar, pili fosc i llarga llista negra que li travessa l'ull. Es pot observar durant tot l'any i és reproductor a l'estany.
Quantitat: 20-30 parelles

ÀNEC COLLVERD (*Anas platyrhynchos*)



FOTJA (*Fulica atra*)



Grisa negrosa amb bec i escudet frontal arrodonit blancs. Ull vermell i potes verdoses amb els dits lobulats. Per arrencar en vol ha de córrer per sobre l'aigua aletejant. S'alimenta sobretot de vegetació submergida. Migrant i hivernant comuna a totes les zones humides del territori, amb el principal contingent al Delta de l'Ebre.
Quantitat: 8-10 parelles

Fosca, amb un to gris blavós al cap i a les parts inferiors i castany a les superiors. Bec vermell amb la punta groga i distintiu escudet frontal vermell. Poc amant de les aigües obertes. És més fàcil veure-la caminar prop de la riba.
Quantitat: 20-30 parelles

POLLA D'AIGUA (*Gallinula chloropus*)



ESPLUGABOUS (*Bubulcus ibis*)



Resident, tot i que més abundant a l'hivern. En expansió. Segueix els tractors i els ramats en busca d'aliment. A l'estany, tot l'any, forma un dormidor espectacular.
Quantitat: 300-1000 ex.

Rapinyaire característic de les zones humides. Cria en els canyissars de l'estany i caça en espais oberts del voltant. A l'hivern forma dormidors col·lectius dins el canyissar.
Quantitat: 2-4 parelles

ARPELLA VULGAR (*Circus aeruginosus*)



AGRÓ ROIG (*Ardea purpurea*)



Més fosc que el bernat pescaire, amb el dors i el sobre de les ales grisens i la cara i el coll vermellosos, amb franges longitudinals fosques. Més esvelt i amb el coll més prim que el bernat. Potes groguenques.
Quantitat: 10-15 par.

Inconfusible: blanca amb rèmiges negres, amb les potes i el bec vermells. Present en cursos fluvials i en menor mesura en aiguamolls. Nidifica en edificis alts i diferents tipus de torres com les que hi ha a l'estany.
Quantitat: 2 parelles

CIGONYA BLANCA (*Ciconia ciconia*)



GAVIÀ ARGENTAT (*Larus michahellis*)



Robust. Blanc, amb el dors gris i la punta de l'ala negra. Potes i bec grocs, amb taca vermella a la mandíbula inferior. S'alimenta sobretot als abocadors i en conreus. El seu caràcter antropòfil li ha permès sortir dels seus dominis marins i colonitzar llocs interiors com l'estany.
Quantitat: 10-15 parelles

Un dels ocells més comuns del canyissar. Tot i ser relativament petit (menys de 20 cm), és fàcil de detectar pel seu distintiu cant, un potent "carrac, carrac, cric-cric-cric, car" que sovint emet des de l'extrem d'una xisca. To general bru olivaci amb parts inferiors més clares. Gola blanquinosa i cella clara. Espècie reproductora a l'estany que hiverna al centre i el sud d'Àfrica.
Quantitat: 30-50 parelles

BALQUER (*Acrocephalus arundinaceus*)



GAVINA VULGAR (*Larus ridibundus*)



Blanca, amb el dors grisenc a l'estiu; mascles i femelles amb el cap de color xocolata. S'alimenta en conreus, rius i abocadors. A Catalunya només cria al Delta de l'Ebre i a l'estany d'Ivars i Vila-sana.
Quantitat: 250-300 parelles

De la mida d'un ànec, amb bec i coll prim i llargs. Dors gris brunenc amb flancs més clars. Galtes, frontal del coll i regió ventral blancs. En el període reproductor mascle i femella s'engalanen el cap amb unes gorgeres vermelloses. S'alimenta de peixos i crancs que pesca capbussant-se. Com el seu nom indica, pot restar capbussat força estona.
Quantitat: 10-15 parelles

CABUSSÓ EMPLOMALLAT (*Podiceps cristatus*)



SABIES QUE...

A l'estany es fa un seguiment ornitològic a través de censos mensuals i l'anellament científic d'ocells. S'hi han detectat més de 235 espècies d'ocells diferents al llarg de l'any i s'hi han anellat més de 30.000 ocells.

En període reproductor hi destaca la presència dels habituals ànecs de superfície, però també d'algunes espècies capbussadores com el cabussó emplomallat i la fotja. Després del Delta de l'Ebre, la segona colònia més important, pel que fa a la presència i al nombre de gavines rialleres i gavines capnegres, es troba a l'estany.

Pel que fa als ocells migratoris, destaca la presència de diversos limícoles i espècies poc habituals que utilitzen l'estany com a lloc de "parada i fonda".

Ho Edita:



Hi col·laboren:

