



# Els ocells més comuns d'observar a l'estany – hivern 2012

## XARXET COMÚ (*Anas crecca*)



L'ànec més petit de la regió. Migrador i hivernant regular i molt comú a tot Catalunya. Mascle gris amb cap castany i antifaç verd que li marxa cap al clatell. Femella bruna amb un pigallat clar.  
**Quantitat:** 150-300 exs.

L'ànec més abundant i gran, predecessor dels ànecs domèstics. Mascle amb cap verd, estret collaret blanc, pit castany i cos grisenc. Femella bruna amb un pigallat clar, pili fosc i llarga llista negra que li travessa l'ull. A l'hivern entrada de migrants que varia segons la cruesa de l'any.  
**Quantitat:** 600-1.400 exs.

## ÀNEC COLLVERD (*Anas platyrhynchos*)



## CORB MARÍ GROS (*Phalacrocorax carbo*)



Negre. Gran, amb el coll llarg i les potes curtes. Bec robust amb la base inferior de pell nua. Sovint descansa amb les ales obertes per eixugar el plomatge. Pesca capbussant-se. Comú en migració i durant la hivernada. A l'hivern s'apleguen en dormidors en arbres que queden blancs d'excrements.  
**Quantitat:** 100-300 exs.

Migrador i hivernant comú a tot el territori. Mida mitjana i bec gran en forma de cullera. Mascle amb cap verd negrós i ull groc. Cos blanc amb una gran taca canyella a la regió ventral i lateral. Femella semblant a la del collverd, amb el bec més ample. S'alimenta filtrant l'aigua superficial.  
**Quantitat:** 200-300 exs.

## ÀNEC CULLEROT (*Anas clypeata*)



## ESPLUGABOUS (*bubulcus ibis*)



Resident, més abundant a l'hivern. En expansió, segueix els tractors i els ramats en busca d'aliment. A l'estany forma un dormidor espectacular.  
**Quantitat:** 300-1000 exs

Fosca, amb un to gris blavós al cap i les parts inferiors i castany a les superiors. Bec vermell amb la punta groga i distintiu escudet frontal vermell. Poc amant de les aigües obertes. És més fàcil veure-la caminar prop de la riba.  
**Quantitat:** + 30 exs.

## POLLA D'AIGUA (*gallinula chloropus*)



Migrador i hivernant comú a les planes agrícoles de tot el territori. Blanca i negra (amb irisacions verdes i morades) i cresta fina. Potes vermelloses. Acostuma a anar en grups nombrosos.  
**Quantitat:** 100-3.000

## FREDELUGA (*vanellus vanellus*)



## GAVIÀ ARGENTAT (*larus michahellis*)



Robust. Blanc amb el dors gris i la punta de l'ala negra. Potes i bec grocs, amb taca vermella a la mandíbula inferior. S'alimenta sobretot als abocadors i en conreus. El seu caràcter antropòfil l'hi ha permès sortir dels seus dominis marins i colonitzar llocs interiors com l'estany.  
**Quantitat:** 100-300 exs.

## ARPELLA VULGAR (*Circus aeruginosus*)



Rapinyaire característic de les zones humides. Cria en els canyissars de l'estany i caça en espais oberts del voltant. A l'hivern formen dormidors col·lectius dins el canyissar.  
**Quantitat:** 30-50 exs.

## PIT-ROIG (*Erithacus rubecula*)



Rodanxó. Dors Marró; cara i pit taronja. A l'hivern freqüent a les bardisses i arbredes de vora l'estany. De caràcter curiós, pel que tot i la mida reduïda es fàcil observar.

## GAVINA VULGAR (*larus ridibundus*)



Blanca amb el dors grisenc. A l'hivern cap blanc amb taca negra darrere l'ull. S'alimenta en conreus, rius i abocadors. Tot l'any, tot i que és a l'hivern quan més abunda.  
**Quantitat:** 1.000-5.000 exs.

## FOTJA (*Fulica atra*)



Grisa negrosa amb bec i escudet frontal arrodonit blancs. Ull vermell i potes verdoses amb els dits lobulats. Per arrencar en vol ha de córrer per sobre l'aigua aletejant. S'alimenta sobretot de vegetació submergida. Migrador i hivernant comú a totes les zones humides del territori, amb el principal contingent al Delta de l'Ebre. Resident comú.  
**Quantitat:** 30-100 exs.

## SABIES QUE...

L'estany és la principal zona humida de l'interior de Catalunya pel que fa al nombre d'ocells aquàtics hivernants. Així, ja l'any 2006 els efectius presents a l'estany suposaven l'11 % del total de Lleida, i el 32 % l'any 2010.

Els censos d'ocells aquàtics hivernants fets fins ara mostren un augment espectacular; passen de 800 l'any 2006 a 6.600 el 2010.

Per tal de d'avaluar l'evolució del poblament ornític de l'estany d'Ivars i Vila-sana es realitza un mínim d'un cens mensual de les espècies aquàtiques presents a l'estany. Les dades obtingudes en aquests censos es completen amb les dades obtingudes en altres projectes de seguiment realitzats per EGRELL i amb les dades publicades en llistes de distribució electròniques o a la web de l'ICO de gestió d'observacions [www.ornitho.cat](http://www.ornitho.cat)

En els últims anys s'han format dormidors importants de corb marí gros (*Phalacrocorax carbo*), esplugabous (*Bubulcus ibis*), gavina vulgar (*Larus ridibundus*) i gavià argentat (*Larus michahellis*).